



菲律賓榕是道地的原生植物，只不過並非台灣所特有，亦分布於印尼、菲律賓等地，但是因為中文名稱冠上菲律賓這三個字，往往會讓人誤以為它是來自菲律賓的外來種植物。這種誤解也常見於其它植物身上，像日本女貞一樣也是台灣原生植物，但也容易讓人直覺地認為它是外來種，這是因為許多植物的中文名常會取自模式標本的採集地或植物學名中的地名之故。

在台灣の榕屬植物中，菲律賓榕和澀葉榕經常被相提並論，原因是這兩種植物實在太過於相似，在台灣維管束植物簡誌の榕屬特徵檢索表中可以發現，菲律賓榕與澀葉榕在各階層の檢索特徵幾乎都一模一樣，像是葉互生；花序柄長於 1 公分；隱花果僅著生在當年生枝條上；葉被有粗糙毛；有明顯の三出脈……等等，檢索表上兩者最後の區分特徵の差異分別為：菲律賓榕の葉**疏**被粗糙毛，基部**略**歪斜；澀葉榕の葉**密**被粗糙毛，基部**明顯**歪斜。對從未看過菲律賓榕與澀葉榕の人而言，這樣的特徵描述，還是難以形成明確の區別概念，即便照著分類特徵一一檢視，還是很容易將菲律榕時會判斷成澀葉榕，而將澀葉榕判斷成菲律賓榕。

不僅外觀特徵上の相似，就連生態特性也是如此，澀葉榕以剛毛和鐘乳體作為葉片的防衛機制，菲律賓榕也是；澀葉榕の葉片上容易有木蝨造癭の現象，菲律賓榕也是；澀葉榕是圓翅紫斑蝶、端紫斑蝶和石牆蝶の食草，菲律賓榕也是。不過，雖然兩者在外部特徵及生態習性上因為過於相似而經常產生混淆，

但透過同時對兩者進行對照，其實也能發現一些辨識上的小訣竅，就拿葉片的特徵來說，菲律賓榕多變的葉片形狀其實是澀葉榕難望其項背的，幼株、成株、嫩葉、老葉經常是不一樣的葉形，只有在葉形呈現完整卵形的階段，才會和澀葉榕的葉片類似。



↑ 菲律賓榕幼株常見葉緣深裂的葉片



↑ 劍形的葉片也常見於幼株上



↑ 隨著植株成熟葉片逐漸變得橢圓而全緣



↑ 呈卵形的菲律賓榕葉片與澀葉榕最為相似

菲律賓榕和澀葉榕的葉表雖然都會因為被有剛毛而容易堆積一些污垢，但澀葉榕葉片的碳酸鈣沉澱經常因為溢出葉表而給人灰白的感覺，菲律賓榕看起來可是清爽多了，成熟葉並不會顯得灰白。不知是不是因為澀葉榕大部分的乳汁都拿去製造鐘乳體了，因此枝葉受損時反倒不若菲律賓榕流出那麼多的乳汁。



↑ 菲律賓榕葉表不易形成碳酸鈣沉澱



↑ 澀葉榕葉表常因碳酸鈣沉澱而有白化現象



↑ 菲律賓榕葉背有光澤感，脈紋不清晰



↑ 澀葉榕葉背不具光澤，脈紋明顯凸起



↑ 菲律賓榕枝葉受損時迅速流出乳汁



↑ 澀葉榕枝葉受損時乳汁則不明顯

或許是澀葉榕對葉片的極度防衛，讓葉片石化得太嚴重，即使掉落後許久都還不易腐爛，樹下所堆積的落葉許多都還具有完整的葉肉，菲律賓榕的樹下則可見許多僅存葉脈的落葉，這倒也變成另一項區別菲律賓榕與澀葉榕的特徵。



↑ 菲律賓榕的樹下常見自然形成的落葉標本



↑ 澀葉榕樹下的落葉許久都不易腐爛

菲律賓榕和澀葉榕的葉片不僅都是圓翅紫斑蝶、端紫斑蝶和石牆蝶的食草，它們的葉片也同時都是木蝨的造癭對象，雖說造癭昆蟲對寄主植物的選擇也有專一性的現象，但菲律賓木蝨所造的蟲癭和澀葉榕木蝨所造的蟲癭看起來都是山峰狀的，蟲癭內也都住著單一的若蟲，單從肉眼的觀察，我實在分不出牠們的差異何在，但似乎澀葉榕的蟲癭以單峰居多，而菲律賓榕的蟲癭出現多峰相

連的情況相當常見，不過這只是從個人的觀察經驗推測，到沒有什麼科學根據！



↑ 菲律賓榕的葉片上較容易看到多峰相連的蟲癭



木蝨若蟲

↑ 比起澀葉榕木蝨的若蟲，菲律賓木蝨的若蟲似乎比較喜歡住在“雙併透天別墅”中



↑ 澀葉榕的蟲癭以單峰居多



↑ 獨居癭內的澀葉榕木蝨若蟲




↑ 菲律賓榕葉片上的石牆蝶蟲卵與幼蟲



↑ 菲律賓榕與澀葉榕成熟葉的尺寸亦有差別

在葉片的觸覺上，菲律賓榕的葉表雖然和澀葉榕一樣長有剛毛，摸起來也很粗糙，但卻不致有卡住的手感，其實若能親自感受並體會兩者在葉片觸覺上的差異，其它的辨識技巧便都是多餘的了！

至於隱花果的形態方面，雖然從外觀上難以找到明確有效的區別方式，但真正的差異是內在而不是外表，分別剖開菲律賓榕與澀葉榕的榕果之後可以發現，菲律賓榕的榕果白晰如玉，而澀葉榕的榕果則有如璀璨的紅寶石。



↑ 菲律賓榕的榕果白晰如玉



↑ 澀葉榕的榕果則璀璨如寶石